DOLICHOS
RONGAI

- Kan gebruik word vir kuilvoer, weiding of hooi.
- Saai 50kg / ha in 1m rye
- Plant gedurende November tot Januarie

OORSIG

'n Jaarlikse / tweejaarlikse agtergrond en is die beste geskik vir warm gebiede met reënval van meer as 800mm, maar sommige kultivars sal groei met ongeveer 650mm reënval. Dolichos bone kan gebruik word vir kuilvoer, weiding of hooi. In terme van vestiging moet dit teen 50kg/ ha in 1 m rye gedurende November tot Januarie gesaai word .



RONGAI

Ingevoer uit Rongai gebied van Kenia tot subtropiese en tropiese Australie in 1962 as CPI- 17883 [VPI 16883]. Dit is 'n laat blom variteit met hoë droëmateriaal produksie. RONGAI het wit blomme en ligbruin sade. In die afwesigheid van ryp, kan dit blom oor 'n tydperk van 'n paar maande. Dit is die mees algemene voer kultivar. Saad gewig is 5000 sade/ kg .

Rongai word in Australië gedurende die somer geplant. Rongai is 'n produktiewe en kragtig eenjarige peulgewas, of kan ook in korte duur 'n meerjarige peulgewas wees. Robuste stam van 3-6 cm, blare is drieledige, breë ovaal-ruitvormig, 7,5-15 cm lank, dun, skerp punt, byna glad bo en kort hare onder. Blaarstele lank en skraal. Saamgepakte blom trosse op verlengde blomasse met wit blomme.

Peule is 4-5 cm lank, breed Scimitar gevorm, glad en beklee deur aanhoudende styl, bevat twee tot vier sade. Sade is buffer of ligbruin gekleur, lateraal saamgepers met 'n lineêre wit opvallende hilium, 1 .0 cm lank en 0,7 cm breed.

Groei tot 1 meter hoog met lang stingels in klim tipes (Tot 6 meter hoog). Blare is behaard en drieledig, 3-15 cm lank en 1,5-14 cm breed. Blomme is pers of wit, 4-20 cm lank en 1,2-1,6 cm in deursneë op blomasse wat 2-40 cm lank is.



Peule wissel in vorm en kleur, plat of opgeblaas, 5-20 cm lank, 1-5 cm breed.